

## Stoma complex : Prolapse stoma

พว. ระพีพร มาศธนพันธ์ M.N.S., APN.,ET nurse หน่วยออสโตมี คลินิก งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลราชวิถี



- Bowel protrudes through the stomal opening in the skin to a greater extent than was anticipated.
- Bowel protruding from 2-3cm to more than 10cm.











- More common occur in loop stomas.
- The most common causes are:
  - An over sized hole made in the abdominal wall at surgery
  - Increased abdominal pressure due to tumor, pregnancy, coughing and sneezing
  - Excessive exertion heavy lifting
  - Poorly developed abdominal muscular support (infants)
  - Obesity



- Conservative management:
  - prolapse can be reduced by the patient lying down on the bed for about 20 minutes to relax the abdominal muscle.





Reduce the intra abdominal pressure.

 Gentle pressure applied continuously against the prolapsed distal loop will aid the bowel to return to the intraperitoneal space.



• Cold compress applied to the stoma will reduce the swelling. (ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็ง วางประคบบน **Prolapse** stoma ประมาณ 5 นาที จะช่วยให้หลอดเลือดหด ลำไส้ยุบ





- One kilogram of granulated table sugar applied to the stoma for 15 min.
- Gentle reduction.




Figure 2 Granulated sugar on prolapsed ileostomy.

Mohammed O, et al., 2013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3604428/
























### สิ่งที่ได้เรียนรู้

:การติดตามเยี่ยมเป็นระยะ

Late complication of stoma

: เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ป่วย+ญาติ+ Health care provider

: ปรับกระบวนการNursing intervention



#### We are team: ET R J



















# BIG THANKS FOR: OSTOMATES ET TEACHERS RAJAVITHI HOSPITAL

